

LA RIZARTROSI in Switzerland

260.000

Gli svizzeri soffrono
di rizartrrosi⁽¹⁾

55-74

anni
i più colpiti⁽²⁾

2°

artrosi
la più frequente
della mano⁽²⁾



1 donna su 3
1 uomo su 8
interessati⁽³⁾

SINTOMI che devono allertare!


Dolori sempre più
intensi alla base del
pollice?



Difficoltà ad afferrare
oggetti della vita
quotidiana?



Deformazione
progressiva del pollice?



Ho dolore e non riesco più a pinzare
con pollice e indice.

COSA DEVO FARE?

Gerarchia progressiva delle soluzioni

1

Esame radiologico

Determina se soffrite di rizartrrosi o di
un'altra patologia

2

Trattamento medico Allevia i sintomi

Antalgici
Antinfiammatori
Tutore notturno
Infiltrazioni

3

Trattamento chirurgico Tratta in modo duraturo il deterioramento dell'articolazione.

Sono possibili vari interventi. Tra questi,
l'impianto di una protesi del pollice (simile
a una protesi d'anca miniaturizzata)

Se il trattamento medico è
insufficiente e i sintomi persistono, si
deve prendere in considerazione un
intervento chirurgico

Per saperne di più
ulla rizartrrosi



Il tuo partner
esperto nel
trattamento della
rizartrrosi

La rizartrrosi, o artrosi del pollice, può rendere
difficile alcuni movimenti, come aprire un
barattolo, girare una chiave o scrivere. Questa
piattaforma fornisce informazioni affidabili per
aiutare a comprendere meglio la patologia e
scoprire le soluzioni disponibili in ogni fase.

misura preventiva, esami tecnici, trattamenti
medici, riabilitazione e, se necessario, opzioni
chirurgiche. Il nostro obiettivo è supportare
ogni paziente con consigli pratici e una rete di
professionisti qualificati per migliorare il suo
comfort quotidiano.



SCANSIONAMI



www.mythumb.ch