

LA RIZARTROSI in Switzerland

260.000

Gli svizzeri soffrono
di rizartrrosi⁽¹⁾

55-74

anni
i più colpiti⁽²⁾

2°

artrosi

la più frequente
della mano⁽²⁾



1 donna su 3
7 / uomo su 8
interessati⁽³⁾

SINTOMI che devono allertare!


Dolori sempre più
intensi alla base del
pollice?



Difficoltà ad afferrare
oggetti della vita
quotidiana?



Deformazione
progressiva del pollice?



Ho dolore e non riesco più a pinzare
con pollice e indice.

COSA DEVO FARE?

Gerarchia progressiva delle soluzioni


1 **Esame radiologico**
Determina se soffrite di rizoartrosi o di
un'altra patologia

2 **Trattamento medico**
Allevia i sintomi
Antalgici
Antinfiammatori
Tutore notturno
Infiltrazioni

Se il trattamento medico è
insufficiente e i sintomi persistono, si
deve prendere in considerazione un
intervento chirurgico

3 **Trattamento chirurgico**
**Tratta in modo duraturo il
deterioramento dell'articolazione.**
Sono possibili vari interventi. Tra questi,
l'impianto di una protesi del pollice (*simile
a una protesi d'anca miniaturizzata*)

Per saperne di più
ulla rizoartrosi



SCANSIONAMI



www.mythumb.ch